

MEDIO AMBIENTE / MUNDO

Nueva zona de actividad volcánica: se originan dos nuevas islas en el mar Rojo

El Ciudadano · 27 de mayo de 2015

Geólogos de la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá (Arabia Saudita) han realizado un estudio que arroja luz sobre el sorprendente surgimiento y posterior transformación de dos nuevas islas volcánicas en el mar Rojo.





Sholan y Jadid son las dos nuevas islas del archipiélago yemení de Zubair que emergieron en medio del mar Rojo a causa de las erupciones volcánicas ocurridas en la zona en 2011 y 2013, informa [‘Nature Communications’](#).

Hasta el presente el mecanismo de formación de estas dos islas volcánicas, como el de las que emergen cerca de las dorsales oceánicas, era poco conocido por los científicos.

Sin embargo los geólogos de la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá indagaron que **Sholan** y **Jadid** habían surgido durante la fase inicial de erupción. Además la erupción coincidió con una serie de temblores en el océano, por lo cual **el archipiélago de Zubair** podría considerarse como **una nueva zona** de actividad volcánica, anteriormente desconocida.

[Fuente](#)

Fuente: [El Ciudadano](#)