

Más del 50% de la población en México tendrá covid en febrero

El Ciudadano · 19 de enero de 2022

Los hospitales estarán bajo presión debido al aumento de admisiones y las ausencias de personal



Por Natalia Vitela Paredes/Agencia Reforma

Más del 55 por ciento de la población mexicana estará infectada con **ómicron para mediados de febrero**, según las estimaciones del **Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington**.

«Nuestros modelos para México sugieren que las infecciones alcanzarán un pico de alrededor de 3 millones (un infectado puede ser asintomático, y en México sólo se hacen pruebas a los que tienen síntomas, ese es el caso) por día para el 19 de enero, aunque los picos en algunos estados variarán considerablemente, con picos posteriores a mediados de febrero en Chiapas y Morelos»

Rafael Lozano

Especialista de ese instituto

Advertió que los hospitales estarán bajo un estrés considerable debido al **aumento de las admisiones y las ausencias de personal**, debido a que está dando positivo y tiene que ponerse en cuarentena.

«El aumento de hospitales que estimamos incluye admisiones que son incidentales, es decir, personas que llegan al hospital con otros problemas y dan positivo por Covid-19. Sin embargo, habrá presión sobre los hospitales, debido a los pacientes con Covid-19 y la escasez de personal»

Lee más: Salud registra un “enorme contraste” entre decesos y contagios por ómicron

Lozano aseguró que después de tres semanas de iniciado el año, se confirma que **ómicron tiene una fracción mucho mayor de infecciones asintomáticas**; una fracción menor de casos diagnosticados que requieren hospitalización y una tasa de mortalidad bastante menor entre los que han sido hospitalizados en comparación con la variante Delta.

Ilustración: Iván Castillo

«El aumento masivo de infecciones no está provocando un aumento proporcional de las muertes porque ómicron es 90-99 por ciento menos grave que otras variantes»

Agregó que **la menor gravedad se debe a** tres factores:

- 1.- La fracción de personas con infección asintomática aumentó del 40 por ciento al 80, 90 por ciento.
- 2.- Entre los que tienen infecciones sintomáticas, la **tasa de hospitalización ha bajado un 40, 60 por ciento.**

- 3.- Entre los hospitalizados, **la fracción que requiere intubación o muere se ha reducido en un 80, 90 por ciento.**

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

➔  bit.ly/2T7KNTI

 elciudadano.com

Fuente: El Ciudadano